

## ตอนที่ 4

### เรื่อง จำนวนจริงในรูป根號 (Radicals)

#### มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน และการดำเนินการเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตระกัจจะ เช่น และการให้เหตุผล อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของผู้คน สามารถนำไปใช้ในการทำงานอาชีพในสังคมและอาชีวศึกษาได้

#### ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป根號 (Radicals) ได้

#### ขอบข่ายเนื้อหา

##### 1. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนที่มีเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนตระกัจจะกับจำนวนจริงในรูป根號

เมื่อ  $m, n$  เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และ  $a$  เป็นจำนวนจริงใด ๆ โดยที่  $a$  ไม่เป็นจำนวนจริงลบ เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนคู่ จะได้

$$\begin{aligned} a^{\frac{m}{n}} &= (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \\ \text{และ } a^{\frac{m}{n}} &= \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = (\sqrt[n]{a})^m \end{aligned}$$

##### 2. การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริงในรูป根號 (Radicals)

###### สมบัติของราก

สำหรับ  $k, m$  และ  $n$  ซึ่งเป็นจำนวนนับที่มากกว่าหรือเท่ากับสอง  $x$  และ  $y$  เป็นจำนวนจริงบวก จะได้

$$1. \sqrt[n]{x^n} = x$$

$$\text{ตัวอย่าง } \sqrt[3]{x^3} = 3$$

$$2. \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y}$$

$$\text{ตัวอย่าง } \sqrt[4]{xy} = \sqrt[4]{x}\sqrt[4]{y}$$

$$3. \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}, \quad y \neq 0$$

ตัวอย่าง  $\sqrt[3]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{y}}$

$$4. \sqrt[kn]{x^m} = \sqrt[n]{x^m}$$

ตัวอย่าง  $\sqrt[16]{x^{12}} = \sqrt[4 \cdot 4]{x^{4 \cdot 3}} = \sqrt[4]{x^3}$

$$5. \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[mn]{x}$$

ตัวอย่าง  $\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}} = \sqrt[12]{x}$

สมบัติเหล่านี้นำไปใช้ในการหาผลบวก ผลต่าง ผลคูณ และผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณ์ที่มีลักษณะครบตามเงื่อนไข

### กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ

ครูผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับบทนิยามของรากที่  $n$  ของจำนวนจริงใดๆ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- การหารากที่สองของจำนวนเต็ม โดยอาจใช้ค่าธรรมหรือใช้แบบฝึกเติมคำตอบสั้นๆ เช่น

รากที่สองของ 4 คือ..... (2 และ -2 เพราะ  $2^2 = 4$  และ  $(-2)^2 = 4$ )

รากที่สองของ 9 คือ..... (3 และ -3 เพราะ  $3^2 = 9$  และ  $(-3)^2 = 9$ )

รากที่สองของ 12 คือ..... ( $\sqrt{12}$  และ  $-\sqrt{12}$  เพราะ  $\sqrt{12}^2 = 12$  และ  $(-\sqrt{12})^2 = 12$ )

การหารากที่สองของจำนวนที่กำหนดให้ เป็นการหาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้จำนวนนั้น หรือการหารากที่สาม รากที่สี่ หรือรากที่ห้าของจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ก็เป็นการหาจำนวนที่ยกกำลังสาม ยกกำลังสี่ และยกกำลังห้าแล้วได้จำนวนนั้น

### กิจกรรมของครูขณะรายการโทรทัศน์

สังเกตพฤติกรรม และความสนใจของผู้เรียน

### กิจกรรมหลังการรับชมรายการ

1. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาตามบทเรียนที่ได้รับชมรายการ

2. ให้ผู้เรียนฝึกทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

1. จงหาค่าของ  $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

2. จงหาค่าของ  $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{125}$

3. จงหาค่าของ  $3\sqrt{20} + 2\sqrt{18} - \sqrt{45} + \sqrt{8}$

4. จงหาค่าของ  $(\sqrt[3]{25} \cdot \sqrt{2})^6$

5. จงหาค่าของ  $\left(\frac{1}{128}\right)^{-\frac{5}{7}}$

6. จงหาค่าของ x

$$\sqrt{16x^2 - 14x - 2} = \sqrt{21x^2 - 23x - 20}$$

3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่รับชม

### แบบทดสอบ

1. จงทำ  $\sqrt[3]{2^3} + \sqrt{2^2}$  ให้อยู่ในรูปอ่าย่างง่ายตรงกับข้อใด

Ⓐ.  $2^4$

Ⓑ.  $2^3$

Ⓒ.  $2^2$

Ⓓ.  $2$

2. จงหาค่าของ  $\sqrt[3]{2} [ 3\sqrt[3]{4} + 2\sqrt[3]{5} ]$

Ⓐ.  $5 + 2\sqrt[3]{10}$

Ⓑ.  $6 + 2\sqrt[3]{10}$

Ⓒ.  $3\sqrt[3]{6} + 4\sqrt[3]{5}$

Ⓓ.  $3\sqrt[3]{6} + 2\sqrt[3]{10}$

3. ข้อใดคือค่าของ  $\frac{\sqrt{50}+\sqrt{32}}{\sqrt{18}}$

Ⓐ.  $3$

Ⓑ.  $6$

Ⓒ.  $3\sqrt{2}$

Ⓓ.  $9\sqrt{2}$

4. จงหาค่าของ  $(\sqrt{72} - 2\sqrt{18}) \left( \frac{\sqrt{90}}{\sqrt{10}} \right)$

Ⓐ.  $0$

Ⓑ.  $1$

Ⓒ.  $6\sqrt{2}$

Ⓓ.  $12\sqrt{2}$

5. จงหาค่าของ  $\sqrt{50} + \sqrt{32} - \sqrt{18}$

Ⓐ.  $3$

Ⓑ.  $5$

Ⓒ.  $6\sqrt{2}$

Ⓓ.  $5\sqrt{2}$

## លេខយប់ដឹងក៉ែត

1. ឈរតារាងនៃ  $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3} &= \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{9 \times 3} - \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} \\ &= (2+3-1)\sqrt{3} \\ &= 4\sqrt{3}\end{aligned}$$

2. ឈរតារាងនៃ  $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{125}$

$$\begin{aligned}\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{125} &= \sqrt{4}\sqrt{5} + \sqrt{9}\sqrt{5} - \sqrt{25}\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 5\sqrt{5} \\ &= (2+3-5)\sqrt{5} \\ &= 0\sqrt{5} \\ &= 0\end{aligned}$$

3. ឈរតារាងនៃ  $3\sqrt{20} + 2\sqrt{18} - \sqrt{45} + \sqrt{8}$

$$\begin{aligned}3\sqrt{20} + 2\sqrt{18} - \sqrt{45} + \sqrt{8} &= (3)(2)\sqrt{5} + (2)(3)\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{5} + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2}\end{aligned}$$

4. ឈរតារាងនៃ  $(\sqrt[3]{25} \cdot \sqrt{2})^6$

$$\begin{aligned}(\sqrt[3]{25} \cdot \sqrt{2})^6 &= ((5^2)^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{2}})^6 \\ &= \left(5^{\frac{2}{3}}\right)^6 \cdot \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^6 \\ &= 5^{\frac{12}{3}} \cdot 2^{\frac{6}{2}} \\ &= 5^4 \cdot 2^3 \\ &= 5,000\end{aligned}$$

5.  $\left(\frac{1}{128}\right)^{-\frac{5}{7}}$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{128}\right)^{-\frac{5}{7}} &= (128)^{\frac{5}{7}} \\ &= (2^7)^{\frac{5}{7}} \\ &= 2^5 \\ &= 32 \end{aligned}$$

6. จงหาค่า  $x$

$$\sqrt{16x^2 - 14x - 2} = \sqrt{21x^2 - 23x - 20}$$

$$\text{ยกกำลังสอง จะได้ } 16x^2 - 14x - 2 = 21x^2 - 23x - 20$$

$$5x^2 - 9x - 18 = 0$$

$$(5x + 6)(x - 3) = 0$$

$$x = -\frac{6}{5} \text{ หรือ } x = 3$$

การตรวจสอบค่าตอบ

แทน  $x$  ด้วย  $-\frac{6}{5}$  ในสมการ

$$\sqrt{16x^2 - 14x - 2} = \sqrt{21x^2 - 23x - 20} \quad \text{ได้สมการเป็นจริง}$$

แทน  $x$  ด้วย 3 ในสมการ

$$\sqrt{16x^2 - 14x - 2} = \sqrt{21x^2 - 23x - 20} \quad \text{ได้สมการเป็นจริง}$$

ดังนั้น เซตค่าตอบของสมการนี้คือ  $\left\{-\frac{6}{5}, 3\right\}$

## เฉลยแบบทดสอบ

1. ก

2. ข

3. ก

4. ก

5. ก